




MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE TODOS LOS SITIOS

ICD-O 3ª: C00 - C80



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAЕ: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).


* PCAE estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER



MORTALIDAD EN URUGUAY CÁNCER DE LA CAVIDAD ORAL Y FARINGE

ICD-O 3ª : C00-C14



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAЕ: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).


* PCAE estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER



MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE ESOFAGO

ICD-O 3ª : C15



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAЕ: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).


* PCAЕ estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER



MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE ESTOMAGO

ICD-O 3ª : C16



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAЕ: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).


* PCAE estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER



MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE INTESTINO DELGADO

ICD-O 3ª : C17



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAE: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).


* PCAE estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER



MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE COLO-RECTO

ICD-O 3ª : C18 - C21



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAE: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).


* PCAE estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER



MORTALIDAD EN URUGUAY CÁNCER DE HIGADO

ICD-O 3ª : C22



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAЕ: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).


* PCAE estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER



MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE VESICULA Y VIAS BILIARES

ICD-O 3^a : C23 - C24



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAE: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).


* PCAE estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER



MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE PANCREAS

ICD-O 3ª : C25



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAe: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).


* PCAe estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER



MORTALIDAD EN URUGUAY CÁNCER DE LARINGE

ICD-O 3ª : C32



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

PCAE: Porcentaje de Cambio anual estimado para el período (1990-2008). Que como se ve es muy próximo a cero (o sea una estabilidad en las tendencias).

* PCAE estadísticamente significativo

Fuente: Registro Nacional de Cáncer - Programa Vigilancia Epidemiológica
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

